

## ABSTRAK

### Perbedaan Stress Kerja Antara Perawat Rumah Sakit Jiwa Dengan Perawat Rumah Sakit Umum

NURI ANGGRAINI  
10 860 0130

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan stress kerja antara perawat Rumah Sakit Jiwa dengan Perawat Rumah Sakit Umum. Subjek Penelitian adalah perawat yang bekerja di RSJD Provinsi Sumatera Utara dan perawat Rumah Sakit Umum RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan yang berjumlah 100 orang. Alat ukur yang digunakan adalah skala stress kerja. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dilakukan dengan menggunakan teknik Analisis Varians 1 Jalur. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka diperoleh nilai atau koefisien perbedaan Anava  $F = 188.879$  dengan  $p < 0,005$ , yang berarti ada perbedaan stress kerja antara perawat Rumah Sakit Jiwa dengan Perawat Rumah Sakit Umum. Selanjutnya dengan melihat nilai rata-rata diketahui bahwa perawat Rumah Sakit Jiwa memiliki stress kerja yang lebih tinggi dengan nilai rata-rata 83.38 dibandingkan dengan perawat Rumah Sakit Umum dengan nilai 58,38. Kemudian hasil perhitungan mean empirik dan mean hipotetik diperoleh bahwa stress kerja perawat Rumah Sakit Jiwa berada pada kategori sedang sebab mean hipotetik (85) lebih besar dari mean empirik (83.58) dimana selisihnya tidak melebihi nilai SD (9.789), dan stress kerja perawat Rumah Sakit Umum berada pada kategori rendah sebab mean hipotetik (85) lebih besar dari mean empirik (58.38) dimana selisihnya melebihi nilai SD (8.275).

**Kata kunci:** Stress kerja, perawat Rumah Sakit Jiwa, perawat Rumah Sakit Umum.